

Strašilka druhu Sungaya inexpectata

Pakobylkovití

Domovinou strašilky druhu Sungaya inexpectata jsou Filipíny.

Maximální velikost těla samičky je 10 cm, samečci mívají menší rozměry, asi 7 cm. Samičky bývají robustnější, samci užší. Tyto strašilky se mohou rozmnožovat partenogeneticky i pohlavně.

V chovech můžeme najít dvě varianty těchto strašilek - klasické a s pruhem na zádech.



Co je potřeba pro chov strašilky druhu Sungaya inexpectata?

- plastový box či skleněné inektárium o minimální výšce 30 cm
- podestýlka: lignocel, rašelina, písek, papírové ubrousky či obyčejný papír bez potisku
- teplota 20–25 °C, vlhčí podnebí - vnitřek ubikace rosíme každé ráno a večer

Čím a jak krmit strašilku?

- větvičky s listy: ostružiník, maliník, růže, dub, buk, břechtan či kaštan
- pokaždé, když strašilky potravu zkonzumují nebo když je potrava už suchá či zažloutlá, je třeba dodat čerstvé větvičky

Zajímavosti

- samičky mají na konci zadečku kladélko, kterým do zeminy kladou černá, kulatá vajíčka s výrazným černým víčkem
- nymfy jsou zpočátku hnědé, ale pak mramorované

Zdroje: Jak se vybavit pro chov strašilek. Světem zvířat: Blog o domácích zvířatech s užitečnými informacemi [online]. [cit. 2021-7-23]. Dostupné z: <https://svetem-zvirat.cz/jak-se-vybavit-pro-chov-strasilek/> KOVAŘÍK, František a kolektiv. HMYZ: Chov, Morfologie. Srážná 17, Jihlava: MADAGASKAR, 2000. ISBN 80-86068-24-2. MICHEK, David. Sungaya inexpectata. Chov bezobratlých zvířat [online]. [cit. 2022-01-30]. Dostupné z: <http://david-zoo.cz/strasilky/sungaya-inexpectata/> SUNGAYA INEXPECTATA. Imladis [online]. Ústí nad Labem [cit. 2022-01-30]. Dostupné z: <https://imladis.webnode.cz/strasilky/sungaya-inexpectata/> Sungaya inexpectata PSG195. Vivarista [online]. 29.8.2014 [cit. 2022-01-30]. Dostupné z: <http://www.vivarista.sk/menu/print.php?clanok=3258>