

Pakobylka indická

(*Carausius morosus*)

Strašilkovití



Pakobylka indická pochází z jižní části Přední Indie. Samice dorůstají délky 8 cm, samci jsou menší (5–6 cm) s delšími tykadly a nohama. Samičky se rozmnožují samooplozením, bez přičinění samečků.

Noví jedinci se z vajíček líhnou za 3 - 6 měsíců, vývoj nymf trvá v průměru 5 měsíců a stejně dlouhou mohou žít i samice, které v produkčním věku kladou okolo 10 vajíček denně.

Co je potřeba pro chov pakobylky indické?

- skleněné insektárium o minimální výšce 24 cm, rosení 1x denně
- podestýlka: dostatečně savý materiál - lignocel, rašelina, písek, papírové ubrousky či obyčejný papír bez potisku
- teplota 25 °C, vzdušné a sušší prostředí

Čím a jak krmit pakobylku?

- tento druh je značně polyfágní, živí se listy různých rostlin: ostružiník, maliník, ptačí zob, lípa, hluchavka, břechtan, tradeskancie atd.
- jakmile je potrava v insektáriu ožrána nebo začíná žloutnout, zasychat nebo černat a plesnivět, je třeba dodat novou
- je vhodné do nádobek doplňovat vodu, pokud potrava příliš rychle vysychá

Zajímavosti

- samci jsou v populaci pakobylky indické velkou vzácností: 1 : 1000 až 1 : 10 000
- pakobylka indická je pakobylkou s nejčastější partogenetickou populací
- vajíčka pakobylky indické jsou značně odolná vůči suchu