

Strašilka australská

(*Extatosoma tiaratum*)

Phasmatidae



V přírodě žije strašilka australská v tropických suchých lesích severovýchodního Queenslandu a Nové Guineje.

Samice dosahují délky až 15 cm, samci, kteří jsou okřídlení a létaví, stěží 10 cm. Původně bisexuální populace často v chovu přecházejí k partenogenezi (vývin nového jedince ze samičího vajíčka neoplozeného samčí pohlavní buňkou). Vajíčka partenogenetických populací mají nižší líhnivost a delší inkubační dobu.

Co je potřeba pro chov strašilky australské?

- skleněné insektárium suchého typu o minimální výšce 45 cm, občasné rosení
- podestýlka: dostatečně savý materiál - lignocel, rašelina, písek, papírové ubrousky či obyčejný papír bez potisku
- teplota v insektáriu: 20–30 °C

Čím a jak krmit strašilku?

- v přírodě se živí převážně blahovičnický
- potravu můžeme podávat v libovolných nádobkách na vodu, měli bychom však maximálně snížit riziko pádu strašilky do nádobky
- strašilka australská přijímá jako potravu např. ostružiník či růžovité rostliny
- jakmile je potrava v insektáriu ožrána nebo začíná žloutnout, zasychat nebo černat a plesnivět, je třeba dodat novou
- je vhodné do nádobek doplňovat vodu, pokud potrava příliš rychle vysychá

Zajímavost

- malé nymfy někdy obtížně začínají přijímat potravu, lze tomu napomoci přítomností žeroucích strašilek ne příliš odlišné velikosti téhož i jiného druhu, v jejichž počercích malé nymfy pokračují